



## Eritropoetin

*Mevcut çalışmaların tamamında, gebelik sırasında kan eritropoetin konsantrasyonunda artma meydana geldiği bildirilmektedir.*

- (↑) Belirgin şekilde artma meydana gelir.

*Physiology of Human Pregnancy Hytten FE, Leitch I. 2nd edition, Oxford, Blackwell 1971.*

- (↑) 9 sağlıklı gebede ortalama konsantrasyonun  $11.2 \pm 9.9$  mU/mL bulunduğu buna karşılık gebe olmayan sağlıklı kadınların oluşturduğu grupta ortalama değerin 6.5 mU/mL olduğu bildirilmiştir.

*Erythropoetin in preeclampsia. Kaupke CJ, Vaziri ND, Powers DR et al. Obstet Gynecol 1991;78:795-799.*

- (↑) Sağlıklı gebelerin oluşturduğu grupta, serum eritropoetin konsantrasyonunun gebe olmayanlara göre belirgin şekilde yüksek bulunduğu bildirilmektedir. 24. haftadan sonra serum eritropoetin konsantrasyonunda daha fazla artış görülür. Eritropoetin konsantrasyonunda artış, anemisi olanlarda daha fazla olur. Kan hemoglobin konsantrasyonu ile serum eritropoetin konsantrasyonu arasında ters korelasyon bulunduğu bildirilmektedir.

*Serum concentrations of erythropoetin in healthy and anaemic pregnant women. Riikonen S, Saijonmaa O, Jarvenpaa AL et al. Scand J Clin Lab Invest 1994;54:653-657.*